

Handleiding Vivani Active Lacto Bac

Hoe gebruiken en dosering:

- Goed schudden voor gebruik.
- 500 ml op 10.000 liter vijverwater. leng de melkzuurbacteriën met lauw water aan. tussen 24 en 28 graden Celsius. 5 tot 10 minuten
- wachten en verdeel dit over de vijver.
- Elke 14 dagen na doseren. 250 ml Per 10.000 liter vijverwater.
- Schakel na het toevoegen van de melkzuurbacterie de UV of/en Ozon en eventuele eiwitafschuimer tijdelijk (24 uur) uit.
- U kunt de melkzuurbacteriën ook over het voer doen. maar maak niet meer aan dan u in één of twee dagen voert.

Wanneer Gebruiken:

- Wanneer er nieuwe vissen in de vijver worden gezet
- Direct nadat u veel water heeft ververs
- Direct nadat u medicijnen hebt gebruikt
- Bij te hoog ammoniak. nitriet en of nitraat gehalte in het water
- Als een booster voor een sterk immuunsysteem vóór de winter of het voorjaar en kan het de slijmhuide weerstand te verbeteren
- Als een ondersteuning na vinrot. schimmelinfecties. verwondingen en schade veroorzaakt door transport kan het sneller herstel en kan
- littekens beperken
- Bij Stres bij de vis om welke reden dan ook
- Met bacteriële problemen zoals Aeromonas en Pseudomonas
- Kan overmatige algengroei terug dringen door hun voedingsstoffen weg te nemen en zorgt voor een natuurlijke balans in het water

